

FICHE TECHNIQUE

ULTRADIFFUSION®

DÉSINFECTION BACTÉRICIDE, LEVURICIDE, FONGICIDE ET VIRUCIDE DES SURFACES PAR VOIE AÉRIENNE

Produit prêt à l'emploi à usage professionnel uniquement POUR L'ÉLEVAGE

USAGE

Usage Biocide (Type Produit 3 et Type Produit 4) : Désinfectant bactéricide, levuricide, fongicide et virucide.

TPO3 Locaux et matériel d'élevage, matériel de transport d'animaux domestiques.

TPO4 Locaux et matériel de stockage, locaux et matériel de production, matériel de transport d'aliments destinés aux animaux domestiques.

INDICATION

Traitement de désinfection bactéricide, levuricide, fongicide et virucide des surfaces par voie aérienne.

- Locaux d'élevage : désinfection contre *Salmonelles* et autres Entérobactéries, *Staphylocoques*, *Entérocoques*, *Listeria*, *Pseudomonas*. Prévention contre les moisissures du genre *Aspergillus*. Efficace sur coronavirus (coronavirus humain E229).
- Couvoirs : désinfection contre *Salmonelles* et autres Entérobactéries. Prévention contre les moisissures du genre *Aspergillus*. Efficace sur coronavirus (coronavirus humain E229).
- Désinfection des œufs à couver.

MODE D'ACTION

Bactéricide/Levuricide/Fongicide/Virucide

Voir tableaux § EFFICACITE

Le produit **FUMAGRI® HA** va libérer dans le volume à traiter hors présence de tout opérateur, une matière désinfectante (Acide glycolique) agissant par contact sur les bactéries, les levures, les moisissures et les virus.

MATIÈRE ACTIVE

Acide glycolique (40 g/kg)

HOMOLOGATION

FUMAGRI® HA - N° d'inventaire biocide : 30570

CONDITIONS D'UTILISATION

- Traiter hors présence humaine et animale. Traiter hors présence de denrées alimentaires.
- Couper les alimentations de gaz, ressuyer les surfaces.
- Déconnecter les cellules photoélectriques commandant l'ouverture des portes.
- Étant donné que le produit génère de la fumée, les systèmes détecteurs de fumée doivent être adaptés pendant l'opération.
- Stopper les ventilations et fermer toutes les issues du local.
- Décompacter la poudre et répartir le nombre de boîtes nécessaires selon le volume à traiter.
- Disposer les boîtes au sol sur un support résistant à la chaleur et au feu, loin de tout matériau combustible (paille).
- Retirer le couvercle de la boîte et allumer la mèche à l'aide d'un briquet type chalumeau en commençant par la boîte la plus éloignée de la sortie.
- Quitter le local en s'assurant du bon fonctionnement du produit et maintenir le local clos.
- Signaler le traitement à tous les accès.
- Respecter un temps de contact de 15 heures.
- Ventiler les locaux en air neuf, pendant 1 heure minimum avant réutilisation.

- Délai de réoccupation du local à l'issue du temps de contact et de ventilation.
- Respecter un intervalle de 24 h entre deux applications.

SÉCURITÉ

- **FUMAGRI® HA** est classé conformément au règlement (CE) n° 1272/2008 :
- **Provoque une sévère irritation des yeux Cat.2 H319**

Conseils de prudence :

- Ne pas respirer les fumées.
- Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage.
- Se laver les mains soigneusement après manipulation.
- EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Si l'irritation oculaire persiste : consulter un médecin.

Informations sécurité :

- Consulter la Fiche de Données de Sécurité et la notice inscrite sur l'étiquette du produit.
- Consulter votre fournisseur et suivre ses recommandations spécifiques.

Sécurité Applicateur :

- Pas d'exposition de l'applicateur, le produit diffuse de façon autonome.
- Porter des gants lors du retrait des doses utilisées.

Sécurité Opérateur :

- En locaux normalement ventilés : pas d'exposition de l'opérateur.
- En locaux non ventilés et confinés : consulter votre fournisseur.

EFFICACITÉ PAR TRAITEMENT PONCTUEL

- **Spectre bactéricide, levuricide et fongicide à la dose nominale de 0.8g/m³.**
- **Spectre virucide à la dose nominale de 1.2g/m³.**

Efficacité requise : réduction de 5 unités logarithmiques pour la bactéricidie et 4 unités logarithmiques pour la fongicidie, levuricide et virucidie.

EFFICACITÉ AVEC UN TRAITEMENT à la dose 0,8 g / m ³ 15 heures de temps de contact selon la norme NF T 72- 281	
SOUCHE TESTÉE	EFFICACITÉ OBTENUE
<i>Pseudomonas aeruginosa</i> - DSM939	> 6.83
<i>Candida albicans</i> - DSM1386	> 6.27
<i>Aspergillus brasiliensis</i> - DSM1988	>5.34
<i>Enterococcus hirae</i> - DSM3320	6.04
<i>Salmonella enterica subsp enterica serotype choleraesuis</i> CIP 104220	>5,84
<i>Staphylococcus aureus</i> - DSM799	> 7.48
<i>Proteus vulgaris</i> - CIP 58 60	6,11
<i>Aspergillus fumigatus</i> - IP 865 64	6,19*
<i>Cronobacter sakasaki</i> - ATCC 29544	5,79
<i>Salmonella heidelberg</i> - DSM 9379	>7,97
<i>Listeria monocytogenes</i> - CIP 103.322	>7,34
<i>Escherichia coli</i> - DSM682	> 5.55

<i>Aspergillus flavus</i> - CIP 597 69	4,6
<i>Eurotium repens</i> - souche sauvage	>4,6

(*) : Efficacité obtenue pour 2h de temps de contact

EFFICACITÉ AVEC UN TRAITEMENT à la dose 1.2 g / m ³ (en présence de 3 g/l albumine bovine), 15 heures de temps de contact selon la norme NF T 72- 281	
SOUCHE TESTÉE	RÉSULTAT
Bovine type 1 Enterovirus (ECBO)	Conforme

EFFICACITÉ AVEC UN TRAITEMENT à la dose 1.2 g / m ³ 15 heures de temps de contact selon la norme EN 17272	
SOUCHE TESTÉE	RÉSULTAT
<i>Parvovirus porcin</i> *	Conforme
<i>Adenovirus Type 5</i> **	Conforme
<i>Murine norovirus</i> **	Conforme
<i>Human Coronavirus E229</i> ***	Conforme
<i>Staphylococcus aureus</i> (essai de distribution)***	Conforme

(*) en présence de 3 g/l d'albumine bovine.

(**) en présence de 0.3 g/l d'albumine bovine.

(***) en présence de 0.3 g/l d'albumine bovine et en présence de 3 g/l d'albumine bovine.

CONDITIONNEMENT

DÉSIGNATION	CONDITIONNEMENT	VOLUME D 'UTILISATION (POUR UN DOSAGE À 1G/M ³)
FUMAGRI® HA 15g	Carton de 24 boîtes	15 m ³
FUMAGRI® HA 50g	Carton de 12 boîtes	50 m ³
FUMAGRI® HA 100g	Carton de 18 boîtes	100 m ³
FUMAGRI® HA 200g	Carton de 12 boîtes	200 m ³
FUMAGRI® HA 400g	Carton de 6 boîtes	400 m ³
FUMAGRI® HA 1000g	Carton de 4 boîtes	1000 m ³

CARACTÉRISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES

Poudre de couleur blanche.

STOCKAGE/DATE LIMITE D'UTILISATION

Stockage : Jusqu'à 2 ans dans un endroit sec - DLU : 2 ans.

Toutes les informations techniques communiquées dans le présent document sont basées sur des données techniques actuellement disponibles, que LCB food safety juge fiable. Elles sont destinées à des utilisateurs expérimentés, agissant à leur seule discrétion et à leur propre risque. Les précautions de manipulation exposées dans ce document sont fournies avec la supposition que les utilisateurs s'assureront au préalable que les conditions d'emploi particulières ne représentent aucun risque pour la santé ou la sécurité. Dans la mesure où les conditions d'utilisation du produit échappent à notre contrôle, nous rejetons toute garantie, expresse ou implicite, à cet égard et déclinons toute responsabilité quant à l'usage fait de ces informations. Dangereux. Respecter les précautions d'emploi. Utilisez les produits biocides avec précaution. Avant toute utilisation lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.